

ICS 65.020.20

B 31

备案号: #####-####

DB

北京市地方标准

DB11/T 570—2008

无公害蔬菜 迷迭香露地生产技术规程

No-polluted Vegetable

Technological standards for Rosemary (*Rosmarinus officinalis* L.) on
open field

2008-07-24 发布

2008-08-01 实施

北京市质量技术监督局 发布

前 言

本标准附录A为规范性附录。

本标准由北京市农业局提出。

本标准由北京市农业标准化技术委员会种植业分会归口。

本标准起草单位：北京市农林科学院蔬菜研究中心。

本标准主要起草人：刘庞源、张宝海、何伟明、韩向阳。

无公害蔬菜 迷迭香露地生产技术规程

1 范围

本标准规定了迷迭香露地生产的产地环境、栽培技术及病虫害防治的要求。
本标准适用于北京地区迷迭香露地的无公害生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 4285 农药安全使用标准

GB/T 8321（所有部分） 农药合理使用准则

GB 16715.5 瓜菜作物种子 叶菜类

NY/T 496 肥料合理使用准则 通则

NY 5010 无公害食品 蔬菜产地环境条件

NY 5089 无公害食品 绿叶类蔬菜

3 产地环境

产地环境应符合 NY 5010 的规定。

4 栽培技术

4.1 品种选择

4.1.1 选用抗病、优质、高产、商品性好、性状稳定、适合市场需求的品种。

4.1.2 种子质量符合 GB 16715.5 的要求。

4.2 育苗

4.2.1 播种育苗

4.2.1.1 播种时间及地点

2~3月在温室内进行。

4.2.1.2 播种方法

采用128孔穴盘育苗，育苗基质为草炭与蛭石，按体积比3: 1比例混合，每立方米基质中加入复合肥0.5 kg，复合肥的氮磷钾比例为15: 15: 15。基质装盘，压穴播种，播种深度为0.5 cm~0.8 cm，播后覆盖蛭石，浇透水。

肥料的使用应符合NY/T 496的要求。

4.2.1.3 苗期管理

播种后盖上薄膜保温保湿，种子发芽适温为15℃~20℃，播后12 d~15 d出苗，出苗后及时揭膜，并保持基质的湿润。当苗长到10 cm左右，大约70 d，即可定植。

4.2.2 扦插育苗

4.2.2.1 扦插时间

2月上旬。

4.2.2.2 扦插基质

基质为草炭加蛭石体积比 2: 1，不宜加肥。

4.2.2.3 扦插方法

在 128 孔穴盘或畦中扦插均可。选取新鲜健康尚未完全木质化的茎，距顶端 10 cm~15 cm 处剪下，

去除枝条下方约 1/3 的叶子，直接插在基质中。

4.2.2.4 扦插后温湿度管理

基质应保持湿润，白天适宜温度 22℃~25℃，夜温适宜温度 18℃~22℃，3~4 周即会生根，7 周后定植到露地。

4.2.3 压条繁殖

把植株接近地面的枝条压弯覆土，长出新根后，从母体剪下，形成新的个体，定植到露地。

4.3 定植

4.3.1 选地、整地、施肥、作畦

选择肥沃、疏松、平整的地块，每 666.7 m² 施用腐熟细碎的有机肥 3 000 kg，与土壤混合后作宽 1.3 m，长 8 m~10 m 的平畦。

4.3.2 定植

扦插育苗的 3 月下旬定植，播种育苗的 4 月中旬定植。定植株行距为 35 cm×40 cm，每 666.7 m² 定植密度为 4 000~5 000 株。

4.4 田间管理

定植后应及时浇水并进行中耕除草。为保证植株健壮，应进行去劣、摘心等工作。在生长过程中，5~6 月和 9~10 月，每月追施复合肥一次，复合肥的氮磷钾比例为 15: 15: 15。

4.5 采收

株高 20 cm~30 cm 开始采收长度为 10 cm 的嫩尖。20 d 左右采收一次。产品安全质量应符合 NY 5089 的要求。

5 病虫害防治

预防为主、综合防治，优先采用农业防治、物理防治、生物防治，结合科学合理的化学农药防治。使用化学农药时，应符合 GB 4285、GB/T 8321 以及相关法律法规的规定。蔬菜生产禁止使用和不得使用的化学农药见附录 A。

附 录 A

(规范性附录)

蔬菜生产禁止使用和不得使用的化学农药

据 2002 年 6 月 5 日中华人民共和国农业部第 199 号公告和 2006 年 4 月 4 日中华人民共和国农业部第 632 号公告, 国家明令禁止使用和不得使用的农药品种清单如下:

A.1 禁止使用的农药

六六六(HCH), 滴滴涕(DDT), 毒杀芬(camphechlor), 二溴氯丙烷(dibromochloropropane), 杀虫脒(chlordimeform), 二溴乙烷(EDB), 除草醚(nitrofen), 艾氏剂(aldrin), 狄氏剂(dieldrin), 汞制剂(Mercury compounds), 砷(arsena)、铅(lead)类, 敌枯双, 氟乙酰胺(fluoroacetamide), 甘氟(gliflor), 毒鼠强(tetramine), 氟乙酸钠(sodium fluoroacetate), 毒鼠硅(silatrane), 甲胺磷(methamidophos), 甲基对硫磷(parathion-methyl), 对硫磷(parathion), 久效磷(monocrotophos), 磷胺(phosphamidon)。

A.2 不得使用的农药

甲拌磷(phorate), 甲基异柳磷(isofenphos-methyl), 特丁硫磷(terbufos), 甲基硫环磷(phosfolan-methyl), 治螟磷(sulfotep), 内吸磷(demeton), 克百威(carbofuran), 涕灭威(aldicarb), 灭线磷(ethoprophos), 硫环磷(phosfolan), 蝇毒磷(coumaphos), 地虫硫磷(fonofos), 氯唑磷(isazofos), 苯线磷(fenamiphos)。

任何农药产品都不得超出农药登记批准的使用范围使用。