

中国梅花鹿和东北马鹿的饲养 管理技术规程

UDC 636.294(510)

GB 6937—86

Technical code for raising and management
of Chinese Deer and Manchurian Wapiti

本标准适用于中国梅花鹿和东北马鹿的饲养管理。

1 饲养

成年公鹿的饲养可区分为：配种准备期的饲养管理；配种期的饲养管理；长茸前期的饲养管理以及生茸期的饲养管理。成年母鹿的饲养可区分为：配种与妊娠期的饲养管理；分娩哺乳期的饲养管理。仔鹿分为哺乳期饲养管理；离乳期的饲养管理；育成期的饲养管理。

1.1 精料要按国家规定的饲料数量喂给。粗料、多汁料等以吃足和不浪费为限。

1.2 饲喂要定时定量。

1.3 每次喂饲料时，必须按饲料的性质、味道分别喂给，改变饲料时，应在能刺激动物食欲的前提下，来规划饲养顺序。

1.4 变更日粮，要逐渐进行。

1.5 饲料要精心保管，不喂发霉腐败饲料。

1.6 日粮配合各种营养物质，要比例合理，味道好，容积要与消化器官相适应。

2 饮水

保证供给充足清洁的饮水，建造好饮水设备，并备有控制饮水的装置。以免鹿在激烈活动后立即饮水。北方冬季饮温水。

3 驯化

鹿场应开展鹿的驯化工作。驯化最主要的方法是人工哺乳驯化。

人工哺乳驯化，首先要使初生仔鹿吃到初乳；其次要保证乳的清洁，做到定时、定量、定温。

4 放牧

4.1 放牧鹿群出圈时，要有领牧员带料袋在前，放牧员领牧犬于后，边走边放，不断地更换牧地。

4.2 保证放牧时间：纯放牧时间冬季4 h，春秋6 h，夏季8 h以上。

4.3 定群划区轮放，每区连续放牧4～6天变换另区，轮回期不少于30天。

4.4 归牧时清点鹿群，丢鹿要及时找回。

5 舍饲

5.1 鹿舍建筑地要背风向阳，地势高燥，与居住地之间有500 m以上的卫生距离。鹿舍所需面积如下页表：

鹿舍的卫生		所占面积, m ²	
		运 动 场	圈 舍
梅 花 鹿	公 鹿	8	2
	母 鹿	8	2
马 鹿	公 鹿	10	3
	母 鹿	10	3

5.2 经常保持圈舍清洁卫生,对于病鹿要及时隔离治疗。

5.3 圈舍要防风防雨保持干燥。

5.4 出入圈舍要注意关闭圈门。

6 配种

6.1 按GB ××××.1—86《中国梅花鹿种鹿》和GB ××××.2—86《东北马鹿种鹿》的要求进行选种。

6.2 公鹿生后第40个月,母鹿生后第27个月以上参加配种。

6.3 加强种公鹿的饲养管理,应多给适口性强的青绿多汁饲料。

6.4 配种期头、二锯公鹿继续放牧,成年公鹿停放圈养。

7 妊娠、分娩

7.1 母鹿妊娠后期,要注意饲料容积的大小,日粮尽量要多样化,确保营养物质的需要。

7.2 妊娠、分娩母鹿,每圈饲养头数不宜过多,要保持鹿群安静。圈内要有充足的垫草。

7.3 妊娠鹿放牧群中的临产母鹿可停放圈养产仔,产后再放牧。对于仔鹿仍留在圈内补饲驯化。以后,将已经初步驯化的仔鹿随母鹿共同放牧。

7.4 产圈内应设置产仔栏、仔鹿小床、饮水与补饲槽等。

7.5 分娩期设值班人员昼夜看管,发现难产应及时助产。

7.6 对吃不上奶的初生仔鹿,要及时找母鹿代养或进行人工哺乳。

7.7 要在仔鹿吃到初乳后进行称重、测尺、刻耳号。

8 仔鹿的培训

8.1 仔鹿小床要有干燥的垫草。

8.2 仔鹿哺乳期60~80天,对晚生的小仔鹿应延长哺乳期,在母鹿配种前断乳。

8.3 断乳仔鹿最好在原圈舍饲养,饲喂优质的饲料。

9 收茸

9.1 收茸前做好准备工作,每天有组织的检查鹿茸生长发育情况,按要求,做到适时收茸。

9.2 收茸时,拨鹿要稳;保定确实,防止事故的发生。

9.3 收茸前要消毒锯茸锯,锯茸速度要快,锯口平,留楂1.5cm。

9.4 锯茸时要作好记录。

10 耳号、耳标或颈标

每头鹿须有个体标记号码,以资记录每只鹿的各种资料。

11 记录统计

生产记录要清楚、整洁、完整。

11.1 鹿只动态记录。

11.2 粗、精、多汁饲料采食量记录。

11.3 收茸记录。

11.4 配种记录。

11.5 产仔记录。

11.6 种鹿卡片。

附加说明：

本标准由中华人民共和国农牧渔业部提出。

本标准由中国农业科学院特产研究所负责起草。

本标准主要起草人刘钟安。